




Coregonus Nasus.

COREGONUS NASUS

Longitud: Los machos pueden alcanzar los 71 cm.

Peso: Aproximadamente 16 kg.

Locomoción: Cuenta con aletas que le permiten desplazarse, con una que es de tejido adiposo.

Reproducción: Este pez alcanza su madurez sexual a los 6 o 7 años. El desove ocurre en octubre y noviembre y en esa ocasión la hembra deposita de 13.000 a 135.000 huevos que tienen 4 milímetros de diámetro.

Nutrición: Se alimenta de larvas de insectos acuáticos, moluscos y crustáceos.

CISNE CHICO

(*Cygnus columbianus bewickii*)



Cygnus columbianus bewickii.
Para alimentarse suele mover sus patas en estanques y lagos para remover la vegetación que se encuentra en el fondo.

Longitud: Alcanza los 1,4 metros.

Peso: Los machos tienen un peso promedio de 6,4 kg que puede alcanzar los 8 kg. El peso promedio de la hembra es de 5,7 kg.

Plumaje: Cuando alcanzan la adultez, en ambos géneros el plumaje es blanco.

Locomoción: Si bien es natural del continente europeo y asiático, migra hacia el norte para anidar.

Reproducción: Suelen poner entre 3 y 5 huevos que son incubados a lo largo de un período de 29-30 días.

Nutrición: Para alimentarse suele mover sus patas en estanques y lagos para remover la vegetación que se encuentra en el fondo.

Adaptaciones al entorno: A pesar de que su habitual forma de alimentación consistía en remover el agua de su hábitat, últimamente también se alimentan en campos de cultivo, implicando un cambio de hábito.