

RHIZOPHAGUS DIMIDIATUS



RHIZOPHAGUS DIMIDIATUS
(fuente: bugguide.net)

Longitud: Menos de 4,5 milímetros.

Aspecto: Tiende a ser marrón o rojizo.

Nutrición: Se alimentan de hongos presentes en árboles de coníferas en descomposición y pueden ser depredadores de escarabajos escolitinos y sus larvas.

Adaptaciones al entorno: Viven bajo la corteza de los árboles para poder adaptarse a su alimentación.

EIDER COMÚN (*Somateria mollissima*)

Longitud: Entre 50 y 71 centímetros.

Peso: Entre 800 gramos y 3 kilos.

Plumaje: En el caso de los machos adultos presentan un plumaje blanco y negro con tonos verdes en la nuca. En el caso de la hembra se trata de un plumaje de tonos marrones.

Locomoción: Puede volar a velocidades de más de 113 kilómetros por hora. Es ágil para el buceo.

Reproducción: El hábitat de reproducción más corriente es el de islas del litoral e islotes con costas bajas rocosas, tanto de agua salada como dulce. Puede llegar a criar en pequeños lagos y estanques de agua situados a 5 o 6 kilómetros tierra adentro. Prefiere las islas de canto rodado o pastizales porque pone a salvo al nido de ataques de depredadores aunque, si se encuentra en las zonas más frías del Ártico, anida en grandes colonias en espacios abiertos, para que puedan protegerse entre sí. Suele anidar en grandes densidades poblacionales, con colonias que tienen hasta 3.000 nidos.

Nutrición: Se alimenta principalmente de moluscos, cangrejos, gambas y, excepcionalmente, de estrellas de mar.

Adaptaciones al entorno: Para evadir a depredadores realizan la cría en grandes colonias o, en caso de hallarse, se ocultan entre cantos rodados y pastizales.



EIDER COMÚN
(*Somateria mollissima*)