



FOCA CANGREJERA
(*Lobodon Carcinophagus*)

FOCA CANGREJERA (*Lobodon Carcinophagus*)

Longitud: Alcanza los 2,2 o 2,6 m como máximo.

Peso: Entre 190 y 300 kg de peso.

Pelaje: Su pelaje puede variar del marrón claro hasta un gris blanquecino.

Locomoción: Se muestran ágiles para el nado, logrando velocidades de más de 25 kilómetros por hora y profundidades de más de 400 metros.

Reproducción: Tras un período de gestación que es de aproximadamente 11 meses, las hembras dan a luz a una cría.

Nutrición: Se alimenta exclusivamente de krill.

Adaptaciones al entorno: Cuenta con una dentadura que le permite atrapar al krill, filtrando el agua y reteniendo el alimento.

FOCA DE ROSS (*Ommatophoca Rossii*)

Longitud: Entre 1,70 y 2,10 m en el caso de los machos y entre 2 y 2,50 m en el caso de las hembras.

Peso: Aproximadamente unos 200 kg.

Pelaje: Cuenta con un pelaje gris oscuro con zonas blancas tanto en el cuello como el pecho.

Locomoción: Para alimentarse puede llegar a profundidades de más de 200 m, con un promedio de 110 m, pudiendo también permanecer bajo la superficie entre 6 y 8 minutos.

Reproducción: La foca de Ross se reúne en parejas a comienzos de diciembre y el período de gestación es de casi 9 meses. Tienen una sola cría.

Nutrición: Se alimenta de distintas especies de cefalópodos, calamares, peces y krill.

Adaptaciones al entorno: La dentadura está preparada para el consumo de cefalópodos. Cuenta con un denso pelaje y una capa de grasa para soportar bajas temperaturas.



FOCA DE ROSS
(*Ommatophoca Rossii*)
(Fuente: Animal Kingdom)