

COLIMBO CHICO**(Gavia stellata)**


Longitud: entre 55 y 67 centímetros de longitud y entre 91 y 110 de envergadura.

Peso: 1.4 kilos, aproximadamente.

Plumaje: Nacen con un plumaje oscuro en el vientre y grisáceo oscuro en el dorso. Tiempo después es reemplazado por uno más claro y luego adoptan las plumas juveniles. En los meses de verano su dorso se vuelve pardo grisáceo y la cabeza gris, con una mancha de color rojo parduzco en la garganta. En invierno su plumaje, en general, se torna blanco.



COLIMBO CHICO
(Gavia stellata)



Locomoción: Esta ave se desplaza fácilmente en el medio acuático ya que sus patas retradas están preparadas para la inmersión. En tierra les cuesta mantener el equilibrio y se deslizan apoyando el vientre en el suelo; no obstante, son capaces de despegar desde la tierra.

Reproducción: Mediante fecundación interna la hembra pone dos huevos, de abril a junio, en un nido que tiene forma de taza y está construido con plantas acuáticas sobre el agua o en la orilla. Los huevos pesan, cada uno, unos 83 gramos, miden 75 x 46 mm y son de color verde oliva o pardo con manchas oscuras. La hembra es quien se ocupa de empollarlos, la eclosión es desincronizada dependiendo de qué huevo se puso primero. A las 10 o 12 horas del nacimiento ya se encuentran listos para nadar y 40 días más tarde ya tienen plumas de contorno.

Nutrición: Su dieta se basa en peces, pequeños crustáceos, moluscos e insectos acuáticos. Para conseguir el alimento bucea por un minuto.

Adaptaciones al entorno: Su cuerpo está adaptado para el buceo con las patas situadas en posición muy retrada en el tronco.