

## CORRELIMOS COMÚN

(*Calidris alpina*)

**Longitud:** 16 a 20 cm de longitud y 38 a 43 cm de envergadura.  
**Peso:** 180 gr, en promedio.

**Plumaje:** Es diferente de acuerdo a la etapa del ave. Las que se encuentran en el período de reproducción presentan un plumaje que se caracteriza por una mancha ventral negra con los límites más o menos difusos; las zonas dorsales tiene tonos rojizos, negros o parduscos. El plumaje de un adulto no reproductor presenta un tono grisáceo, vientre blanco y finas estrías en el pecho y cuello. Los más jóvenes son de pelaje pardo – anaranjado con un rayado difuso en el pecho y el cuello.

**Locomoción:** Son aves migrantes que tienen la capacidad de volar al ras del agua.

**Reproducción:** Entre abril y mayo, la hembra pone 3 o 4 huevos, tras la fecundación interna. La incubación dura entre 21 - 22 días y es realizada por ambos. Las crías se desarrollan completamente tres semanas más tarde de su nacimiento.

**Nutrición:** Se alimentan de pequeños invertebrados que consiguen tras picotear en el fango. Consumen insectos, larvas, pequeños crustáceos y anélidos.

**Adaptaciones al entorno:** El pico fino y largo les permite escarbar en la arena para buscar alimento.



### CORRELIMOS COMÚN (*Calidris alpina*)

El pico fino y largo les permite escarbar en la arena para buscar alimento. Son aves migrantes que tienen la capacidad de volar al ras del agua.