

AZOR COMÚN

(Accipiter gentilis)



Longitud: 50-60 cm.

Peso: 515-2250 gr.

Pelaje: En el dorso presenta un plumaje pardo – grisáceo; en la nuca, blanco; en la cola, oscuro con un voluminoso plumero blanco en el nacimiento de éstas. En la garganta y pecho cuenta con plumas claras y estrías oscuras; las alas son bastantes claras.

Locomoción: Es capaz de sostener una velocidad considerable en vuelo horizontal para la búsqueda de su presa, llegando a los 61 km/h.

AZOR COMÚN (subtítulo)
(Accipiter gentilis)

Para poder volar entre los árboles del bosque cuenta con alas cortas y anchas y una cola larga. Esta condición le facilita maniobrar.



Reproducción: Los adultos retornan a sus territorios de anidación en marzo o abril y comienzan a poner huevos en abril o mayo. En cada puesta las hembras ponen de 1 a 5 huevos que incuban durante 28 - 38 días. Los jóvenes abandonan el nido después de 35 días y comienzan a volar 10 días más tarde. Los jóvenes pueden permanecer en el territorio de sus padres durante un año.

Nutrición: Consume pequeñas aves, como cuervos o palomas; pequeños mamíferos, como conejos o ardillas, y lagartos e insectos.

Adaptaciones al entorno: Para poder volar entre los árboles del bosque cuenta con alas cortas y anchas y una cola larga. Esta condición le facilita maniobrar.