


CÁRABOS
(Strix aluco)

La ubicación de los ojos al frente de su cabeza le dan mejor visión binocular que otras aves de presa nocturnas, además de contar con una retina que le facilita ver en condiciones de poca luz.

CÁRABOS
(Strix aluco)

Longitud: 40 cm. Cuenta con una envergadura alar que está entre los 81 y los 105 cm.

Peso: entre 385 y 800 gr.

Plumaje: Es diverso; algunos ejemplares son rojizos, otros con tonalidades marrones y también existen grisáceos. La diferencia de coloración no se relaciona con el sexo, la edad, el peso, ni el área en que habitan.

Locomoción: Son aves esencialmente sedentarias que al momento de volar de manera pesada y lenta, dando fuertes aleteos en el aire. Su vuelo es silencioso porque tiene plumas suaves y livianas que facilitan ello.

Reproducción: Son aves monógamas que adoptan como nido los agujeros naturales de los árboles. A mediados de marzo comienza la época de cría, en cada puesta la hembra pone entre 1 y 5 huevos redondos y blancos. Los incuba por un mes y el macho se ocupa de proveerle alimento. Las crías al nacer deben ser alimentadas por sus padres, luego de tres meses adquieren la independencia absoluta.

Nutrición: Su presa predilecta son los roedores y su dieta suele estar basada en el topillo rojo (*Myodes glareolus*), particularmente en el continente europeo.

Adaptaciones al entorno: Este búho no es migratorio y resulta territorial. Su capacidad auditiva se encuentra facilitada para la caza porque sus oídos se encuentran ubicados de forma asimétrica, dándole la posibilidad de escuchar en varias direcciones, permitiéndole detectar sonidos de baja frecuencia. La ubicación de los ojos al frente de su cabeza le dan mejor visión binocular que otras aves de presa nocturnas, además de contar con una retina que le facilita ver en condiciones de poca luz.