

FAUNA

La fauna silvestre es una de las más ricas y exuberantes de la nación, producto de una innumerable cantidad de hábitats y nichos ecológicos presentes. Dentro de la gran cantidad de especies que podemos hallar, realizaremos una clasificación:

Mamíferos

Entre los felinos:

El puma, la pantera negra, el tigre mariposa y el jaguar (*Panthera onca*)

De los pequeños carnívoros podemos citar:

- La nutria o perro de agua (*Pteronura brasiliensis*) que es muy difícil de encontrar, ya que ha sido víctima de los cazadores furtivos que venden sus pieles a través de Colombia. Debido a la poca cantidad de especímenes que quedan con vida, ha sido incluida en la lista de mamíferos del "Red Data Book" como especie amenazada. El perro de agua, inspiración de leyendas indígenas, se observa casi siempre en grupos de cuatro a diez individuos que cazan juntos.
- El cuchicuchi (*Potos flavus*) es un carnívoro de hábitos nocturnos y pasa su vida sobre los árboles, en cautiverio es muy cariñoso y manso.
- El zorro guache, las comadrejas y un ejemplo muy raro es el perro de monte o perro mudo, sobreviviente autóctono casi desconocido.
- Entre los edentados, el cachicamo que puede llegar a medir más de un metro de largo.

Entre los grandes mamíferos:

- La danta o tapir (*Tapirus terrestris*) es el animal selvático más corpulento de la fauna autóctona, llegando a pesar hasta más de 300 kilos. Se alimenta de hojas y diversas frutas y en la región del Ventuari se le puede ver con frecuencia en los ríos y caños comiendo plantas acuáticas y algunas especies peculiares. El sentido desarrollado de la danta es el olfato, mientras que su visión es deficiente.
- Entre los porcinos está el báquiro (*Dicotyles tajacu*), que a veces se observa en grandes manadas; en cuanto a los ciervos, algunas especies de venados en alejadas sabanas o en las selvas.

Grandes roedores entre los más conocidos están:

- Chigüire (*Hydrochoerus hydrochoeris*) es el más grande de todos: su peso es de hasta más de 50 kilos. Se suele encontrar viviendo en grupos familiares o en grandes manadas cerca de los ríos.

Extensa variedad de primates:

- El Mono araña o marimonda *Ateles (Bezelbuth hybridus)* es uno de los más grandes de América y un excelente trepador que utiliza su larga cola para moverse de rama en rama.
- Mono araguato (*Alouatta seniculus*): sus fuertes aullidos a la salida y a la puesta del sol lo hacen fácilmente localizables.
- El Mono machango, maicero o capuchino (*Cebus nigrivittatus*), es muy vivaz y domesticable, su alimentación consiste en insectos, frutos, granos de maíz, cacao y hojas.
- Mono tití (*Saimiri sciureus*), de pequeño tamaño es vivaracho y juguetón.
- Mono de noche, machín, viudita: y el tranquilo, simpático e inteligente mono caparro.

La rica fauna de la región está representada por numerosos especímenes de mamíferos, reptiles, peces y aves.

Abajo vemos una pantera y a la derecha observamos un puma de estas regiones.



Aves

Zancudas:

- El garzón soldado (*Jaribu mycteria*) es el miembro de las cigüeñas más grande de Venezuela y mide hasta 1,50 m. Construye sus nidos sobre árboles y palmeras y protege sus crías con ferocidad.
- El gabán (*Euxenura maguari*) es un tipo de cigüeña que se ve con más frecuencia en las sabanas que junto al agua abierta, hace sus grandes nidos sobre arbustos bajos y árboles medianos. Se alimenta de pequeños mamíferos, sapos, insectos y reptiles.
- Garzas de varios colores y tamaños.

Entre las palmípedas sobresale:

- El pato real (*Cairina moschata*) es el más grande de todos los patos y pone hasta treinta huevos.
- El pato carretero (*Neochen jubata*) es frecuente en lagunas, caños y ríos con orillas abiertas de bosque, también se le conoce como ganso del Orinoco.
- El Guiriri (*Dendrocygna autumnalis*) forma bandadas de hasta mil ejemplares y debe su nombre al sonido peculiar de su canto.

Gallináceas:

- El paujé de copete (*Crax daubentoni*), durante la estación seca se agrupa en bandadas de cuatro a doce aves y el resto del año en grupos familiares más reducidos.
- Pava o Uquira (*Penelope jacquacu*) es considerada un especie en extinción. Busca alimento en el suelo pero anidar en los árboles y en ellos busca refugio al ser molestada.
- Guacharacas y perdices

Abundantes y muy importantes son las diferentes familias de pájaros:

- Los colibríes, tucúsitos o chupaflores son los más pequeños entre las aves. Inmovibles en el aire, aletean a 60 veces por segundo para comer insectos o chupar el néctar de las flores. Dicha actividad hace que cumplan un papel destacado en las fecundaciones de las plantas.
- Los guacamayos son la especie más grande de la familia de los papagayos, viven en parejas y su alimento favorito son las frutas.
- El loro real o cabeza amarilla (*Amazona ochrocephala*) anda en bandadas ruidosas y no es fácil distinguirlos sobre los árboles ya que el color de sus plumas los mimetiza sobre el follaje.
- El Perico calzoncito (*Pionites melanocephala*), es uno de los más vistosos ya que se encuentran en bandadas y come semillas, nueces y frutas.

Algunas de las aves que podemos encontrar en el Estado son: Águila, águila arpía (en peligro de extinción), gavián, guacamaya, catana, carpintero, paujé, tucán, etc.



- El Perico o churica (*Brotogeris jugularis*) se encuentra en bandadas pequeñas y andan en pareja de la cual no se separan.
- La Lechuza orejada (*Buho virginianus*) es la más grande de Sudamérica y puede medir hasta 51 cm de altura, se alimenta de ratas y otros pequeños animales.
- El Nictibios Grande o flojo (*Nyctibius grandis*), no fabrica su nido sino que busca un hueco en la corteza de un árbol para poner su único huevo. Esto y su canto bajo y ronco le dan su nombre: de hábitos nocturnos, durante el día permanece inmóvil sobre una rama cerca del tronco cuya corteza es idéntica a su plumaje.
- El Martín pescador (matraquero *Cloroceryle amazona*), se alimenta mayormente de pequeños peces que atrapa zambulléndose en el agua, siendo alegre y confiado.
- El Gallito de roca (*Rupicola rupicola*), es una de las aves más preciosas de la selva con su encendido plumaje, anida entre las rocas de las cascadas y los ríos.
- El Tucán Piapoco (*Ramphastos tucanus*), es inteligente y voraz. Se alimenta de frutos maduros como guayabas, lechosas, etc.
- El Turpial (*Icterus icterus*), es la ave nacional de Venezuela y forma parte de los pájaros cantores más bellos del país. Su sonido variado y melodioso se escucha al amanecer y es muy apreciado en los hogares, vive solo o en parejas y se alimenta de insectos y frutas.
- Gonzalito (*Icterus nigrogularis*), es un miembro de la familia del turpial.
- El Sangre de toro (*Pyrocephalus rubinus*), es un pequeño que atrapa moscas y se distingue por su coloración rojo escarlata. En invierno grupos de esta especie migran desde la Argentina hasta Venezuela y Colombia.
- Azulejo (*Thraupis lepiscopus*).
- El Gavilán colorado (*Busarellus nigricollis*), se alimenta mayormente de peces y cangrejos.
- Además encontramos los conotos, verdines y siete colores.
- Para terminar mencionaremos la importante águila arpía, que dicen que puede levantar un niño, pues su vuelo es poderoso y sus garras muy grandes y fuertes.

Entre las aves encontramos el paji nocturno, pájaro paragua, guacamaya, y gran variedad de especies de tucanes.



Reptiles

El gran caimán del Orinoco (Crocodilus intermedius):

- Especie seriamente amenazada que anteriormente se encontraba en casi todos los ríos hoy existen sólo pocos ejemplares, puede medir hasta 4 m en total.

La baba Caimán (crocodrilus):

- Las hembras adultas miden entre 1,50 m y 1,80 m mientras que los machos pueden alcanzar los 2,90 m. La nidificación la inician entre julio y agosto, cada hembra pone de 25 a 35 huevos y permanece cerca del nido para defenderlo de los depredadores. Muestran gran celo maternal con las crías y cuando se acerca el final del invierno las dirigen a las zonas de agua permanente, cargándolas sobre la espalda o dentro del hocico.

La iguana (Iguana iguana):

- Llega a medir hasta 1,50 m incluyendo la larga cola. Pasan la mayor parte del tiempo sobre los árboles donde comen hojas, frutas y flores. Su color varía desde el verde claro hasta el gris azulado en los ejemplares grandes y viejos.

Entre los ofidios no venenosos se destacan:

- La anaconda o culebra de agua (Eunetes murinus), es la culebra más grande que existe y puede llegar a medir hasta 10 m de largo. Nada muy bien y se alimenta de peces, aves, lagartos y en ocasiones animales de mayor tamaño.

- El Tragavenado Boa constrictor mide hasta 4 mts y a pesar de su nombre no es capaz de tragar ni un venado muy pequeño, se alimenta de ratas y pequeños animales y pasa la mayor parte del tiempo sobre los árboles.

Batracios de gran tamaño como el zarando o aú

Hay una gran variedad de quelonios:

- El morrocoy (Geochelone carbonoria).

- Anfibios como Galápago (Prodocnemis vogli), se pueden ver sobre los troncos de árboles caídos o en las orillas de los caños, son mañosas y huyen a la primera señal de peligro.

- La Tortuga del Orinoco (Arrau Podchemis expansa) es la de mayor importancia ya que se encuentra actualmente en peligro de extinción. La hembra es de mayor tamaño que el macho y puede pesar hasta 30 kilos.

- Además están el terecay, el cabezón y el chipiro.

El gran Caimán del Orinoco (derecha) es una de las mayores especies de cocodrilo, ya que puede alcanzar probablemente una longitud máxima de seis metros.



Se estima que la cantidad de especies de peces amazónicos, ronda en 2.500 variedades.



Peces

El gigante laulau o valentón, bagre rayado, yake, carajo, morocoto, cachama, palometa, pámpano, caribe azul, payara, curbina, pavón, entre otros.

El Temblador, famoso por el potencial eléctrico de su cuerpo, capaz de matar a cualquier animal y hasta a una persona, pueden crecer hasta dos metros.

Existen en los pequeños caños y numerosas lagunas gran cantidad de preciosos peces ornamentales poco conocidos.