FAUNA

LA FAUNA DE LOS BOSQUES SECOS DEL MARAÑON

Tiene tres grupos de especies: las relacionadas con el bosque seco del lado del Pacífico: al menos un 50% de las especies se encuentran también en el valle del Marañón, las relacionadas con la Amazonía: oso hormiguero (Tamandua mexicana), jaguar, lobito de río (Lutra longicaudis), sajino, guacamayo rojo (Ara militaris), pato criollo (Cairina moschata).



Entre las aves endémicas destacan: paloma del Marañón (Columba oenops), perico del Marañón (Forpus xanthops), canastero del Marañón (Phacellodomus dorsalis), el gallito Marañón (Melanopareia maranonica), el mirlo del Marañón (Turdus maranonicus), los fringilos inca (Incaspiza ortizi), el inca frenillo anteado (Incaspiza laeta), el fringilo-inca pequeño (Incaspiza watkinsi).

Los principales reptiles endémicos son: jergón shushupe (Bothrops hyoprora), la culebra caracolera (Dipsas latifasciata), la boa picmea suoriental (Tropidophis taczanowskii), el saltojo (Phyllodactylus interandinus), y las lagartijas (Tropidurus stolzmanni).

LA FAUNA DEL BOSQUE TROPICAL DEL PACÍFICO


Se trata de una formación boscosa, que se extiende desde América Central hasta el interior del departamento de Tumbes, cuya fauna pertenece a la Provincia Pacífica del Dominio Amazónico. En el Perú esta ecorregión abarca una pequeña área denominada "El Caucho" en el departamento de Tumbes y que limita con el Bosque Seco Ecuatorial.

Posee un clima de tipo tropical húmedo con temperaturas mayores a los 25° C; con lluvias entre los meses de diciembre a marzo y una época seca de 8 meses en la cual se presentan neblinas matutinas.

Los suelos son, por lo general, aluviales, con predominancia de latosoles, podsoles rojo-amarillentos y lateríticos castaños.

La orografía es de colinas, que raras veces superan los 500 msnm, con numerosas quebradas. En algunos sectores es bastante abrupta, especialmente en las partes en que el río Tumbes corta los cerros de Amotape (bocana Murciélago y cañón de Ucumares).

Tumbes, que limita la región por el lado peruano, al este y sur, y el Zarumilla, cuya cuenca alta drena el área. Existen una serie de afluentes secundarios, que drenan hacia los ríos principales y





Conejo silvestre

palmeras.

Especies destacadas

higuerones (Ficus spp.),

el palo de vaca (Alseis

peruviana), el amarillo

(Cedrela sp.), el cetico

guayacán (Tabebuia

sp.), el palo barrigón

(Pachira trinitatis), el pretino (Cavanillesia platanifolia), el ajo-ajo (Cordia sp), el basayo (Guazuma ulmifolia), el palo balsa (Ochroma pyramidale) y varias

acromon), el cedro

(Cecropia sp.), el

Las especies más resaltantes son los

(Centrolobium