



ENCICLOPEDIA DE FORMOSA, ARGENTINA

Índice

TOMO 1	
Formosa	Pág. 1
Bandera provincial	Pág.2
Escudo provincial	Pág.2
Geografía	Pág.3
Clima	Pág.4
Flora	Pág.5
Fauna	Pág.7
Recursos hídricos	Pág.10
Demografía	Pág.11
Ubicación	Pág.11
TOMO 2	
Historia	Pág.14
Los primeros pobladores	Pág.14
Limitando la región	Pág.15
Ley 1532: división del territorio nacional	Pág.16
Tratado de paz y límites con Paraguay	Pág.18
Proceso de provincialización	Pág.19
Región del Norte Grande Argentino	Pág.20
Personalidades destacadas de Formosa	Pág.20
La guerra del Chaco: litigios con Paraguay y Bolivia	Pág.24
Petróleo	Pág.28
Las fuerzas militares	Pág.29
El comienzo de las hostilidades	Pág.30
La conexión argentina	Pág.32
La guerra sigue	Pág.33
Se acerca el final	Pág.35
El fin de la guerra	Pág.38
Espías argentinos	Pág.39
Historia administrativa de Formosa	Pág.41
Escudo Nacional	Pág.43
Los indígenas de hoy	Pág.44
Últimos hitos históricos	Pág.48
Gobierno	Pág.50

Actual organización administrativa	Pág.51
Organización política	Pág.52
Economía	Pág.53
Actividad ganadera	Pág.53
Agricultura	Pág.54
Actividad forestal	Pág.58
Actividad apícola	Pág.60
Hidrocarburos	Pág.60
Actividad industrial	Pág.61
Exportaciones	Pág.61
Turismo	Pág.62
Plantas de energía	Pág.62
Estructura social	Pág.63
Actividad petrolera	Pág.63
Actividad obrajera	Pág.65
Alimentos típicos	Pág.65
Artesanías	Pág.66
Medio ambiente de Formosa	Pág.67
Estructura económica	Pág.70
Características sociales	Pág.71
Producción	Pág.73
Servicios	Pág.75
 TOMO 3	
Turismo	Pág.76
Ciudades más importantes	Pág.76
Sitios para visitar	Pág.77
Reserva Natural Formosa	Pág.86
Reserva de Biósfera Teuquito	Pág.88
Formosa capital	Pág.88
Deporte	Pág.100
Pesca deportiva	Pág.100
Estadio polideportivo de Formosa	Pág.100
Estadio de la Liga formoseña de fútbol Antonio Romero	Pág.101
Cultura	Pág.103
Influencia de los primeros pobladores	Pág.103
Artesanía aborígen	Pág.106
Rituales musicales	Pág.110
Influencia guaranítica y salteña en la lengua	Pág.111
Literatura	Pág.112
Fiestas y eventos populares	Pág.115
Música	Pág.117
Mitos y leyendas	Pág.120
Danza típica: el chamamé	Pág.133
Artistas famosos	Pág.136



FORMOSA

La Provincia de Formosa se encuentra ubicada en la Zona Nordeste de la República Argentina y ocupa de manera íntegra todo el área del Chaco Central. Se define por su particular paisaje: la sabana parque. Este es el gran ecosistema de toda la llanura chaqueña, que está conformada por otros dos grandes bloques: el Chaco austral (ubicado también en la República Argentina) y el Chaco boreal (ubicado en territorio paraguayo). Justamente la provincia limita tanto al este como al norte con la vecina República del Paraguay, al oeste con la provincia de Salta y al sur con la de Chaco.


Se extiende entre los paralelos 22° y 27° de latitud sur y los meridianos 57° y 63° de longitud oeste de Greenwich. Es atravesada en su zona norte por el Trópico de Capricornio, que la ubica en la región subtropical del país. Tiene una superficie de 72.066 km².

Administrativamente, el territorio formoseño ha sido dividido en nueve departamentos: Bermejo, Formosa, Laishí, Matacos, Patiño, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, y Ramón Lista. Además de la capital, que comparte nombre con la provincia, sus localidades más importantes son: Clorinda, Espinillo, Pirané, San Francisco de Laishí, Comandante Fontana, Laguna Yema, Ingeniero Juárez y General Enrique Mosconi.



BANDERA PROVINCIAL

Lo que se buscó reflejar a través del diseño de la bandera provincial fue la privilegiada ubicación que tiene dentro de Sudamérica y su rol como integrador regional, teniendo en cuenta la intensa relación de Formosa con Paraguay así como con el resto de la Argentina. Fue entonces a partir de ese principio rector que prioriza la importancia geopolítica de la región es que se realizó la insignia que la representa.



El paño partido en tres campos representa el Cono Sur abrazado por los dos Océanos, expresado en los colores celeste y blanco de nuestra Bandera Nacional. Se intenta reflejar la presencia de Formosa en el corazón del Continente subrayando el proyecto de integración a través de su extensa frontera como invariante histórica.

Es de destacar para una mejor comprensión de la ubicación geográfica de la Provincia en el país, el ser atravesada por el trópico de Capricornio. Esto se ha marcado mediante una guirnalda de laureles que cruza todo el paño en sentido longitudinal. La estructura institucional de la Provincia se sintetiza en nueve estrellas dispuestas en el círculo a la altura del trópico, componentes ya presentes en el Escudo Provincial.

Dos premisas importantes condicionaron el diseño, la primera, la condición de toda bandera de ser leída indistintamente por ambas caras, lo cual restringió el empleo de formas y textos, y la segunda, la simplicidad de trazado presentado en su reproducción a nivel escolar e institucional.

ESCUDO PROVINCIAL

El escudo oficial de la Provincia de Formosa se eligió a partir de un concurso, a través de una ley de junio de 1958. A partir de esa convocatoria es que se decidió por el escudo presentado por Juan Enrique Bejarano.

El mismo consta de un campo poligonal irregular de ocho lados, que a su vez está dividido en dos cuarteles. El cuartel superior, de color azul, tiene un capullo de algodón, símbolo de un porvenir productivo e industrial, coronado por nueve estrellas dispuestas simétricamente, que representan los departamentos provinciales.



En el cuartel inferior - debajo de la línea divisoria - dos vigorosas manos entrelazadas simbolizan la unión de todos sus hijos.

En lo alto un sol naciente con rayos en disposición de engranaje, simboliza la nueva provincia y en la parte inferior dos ramas de laurel.

El escudo fue declarado emblema oficial de la Provincia por Ley N° 69 - Sancionado el 29 de Junio de 1.959 y Promulgado el 7 de Julio de 1.959 por Decreto N° 741.



Geografía



La provincia de Formosa se ubica sobre un plano suavemente inclinado, que forma la planicie chaqueña. El sistema hidrográfico autóctono se encuentra en el borde oriental de esta cuenca sedimentaria. El mismo fue generado por los excesos locales de agua que forman esteros y cañadas. De esta manera, se favoreció el desarrollo de selvas en galería y la existencia de amplias zonas de meandros y la formación de depósitos aluvionales que dificultan el drenaje.

El gran Chaco se encuentra ubicado en la región comprendida por la República Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia y comprende una inmensa llanura de algo más de un millón de kilómetros cuadrados, formada por sedimentos geológicamente jóvenes, del cuartario, de un espesor de 300 metros que cubren rocas muy antiguas, tan viejas como las de las sierras de Córdoba, del paleozoico, existiendo en algunas de ellas yacimientos petrolíferos. Si bien esta región conforma una gran unidad natural, puede ser dividida, según sus diferentes regímenes de lluvias, tipos de relieves y roca madre en cuatro subregiones:

- **Chaco serrano:** de relieve montañoso.
- **Chaco Seco:** dominan las especies leñosas y hay arbustales y bosques.
- **Chaco Estacional o de Transición:** abundan pastizales, pantanos, bosques y selvas.
- **Chaco Húmedo:** hay pastizales, pantanos, bosques y selvas.

Las provincias de Formosa, Chaco, parte de Salta, Santiago del Estero y Santa Fe se encuentran dentro de esta región chaqueña o llanura boscosa.

Características:

Esta extensa región del Gran Chaco, posee un terreno plano, boscoso, con numerosos ríos, arroyos, lagunas y esteros en la sección oriental, que estimulan el desarrollo de una abundante vegetación subtropical, alternando los grandes bosques con extensas sabanas. Los suelos agrícolas de la provincia de Formosa ocupan el 22% de la superficie del territorio provincial, y los suelos agrícolas con limitaciones tanto de erosión como anegamiento temporal o sequía, representa el 20%.



Cruz del Norte en el Ingreso a la Ciudad de Formosa.

CLIMA

En la provincia de Formosa se pueden distinguir dos tipos de climas, de acuerdo a su posición geográfica:

Clima Cálido Subtropical Húmedo: Se genera al Este de la provincia, con temperaturas ligeramente inferiores y precipitaciones abundantes durante todo el año, superiores a los 1000 milímetros anuales, arroja un balance hídrico siempre positivo.


Clima Cálido con Estación Seca: Se genera al Oeste de la provincia. Provoca temperaturas medias anuales superiores a los 23ª C, con moderadas amplitudes térmicas estacionales y balance hídrico marcadamente deficitario. Entre ambos extremos se ubica una amplia franja en la que se opera de este a oeste una gradual disminución de las lluvias de 1000 mm a 650 mm anuales.

La Provincia de Formosa se ubica en la región subtropical del país. Por su zona norte atraviesa el trópico de Capricornio. Las temperaturas máximas se registran entre los meses de diciembre y enero. Sin embargo estas características tropicales son alteradas por irrupciones de masas de aire frío austral, que originan pronunciadas bajas térmicas, lo que se evidencia en la zona Centro - Oeste de la Provincia. Este carácter de continentalidad, no se evidencia tanto en las temperaturas mensuales sino en las variaciones térmicas diarias, cuya amplitud térmica diaria aumenta de Este a Oeste. El período de mayor frecuencia de heladas se registra entre los meses de mayo a agosto.

El régimen de lluvias presenta también variaciones importantes ya que se registran más de 1.200 mm anuales en la zona Este, en las riberas del río Paraguay, y disminuye hacia el Oeste hasta alcanzar los 600 mm en el límite con la provincia de Salta.

El período de lluvias abarca desde mediados del verano hasta los primeros meses del otoño, en el invierno las lluvias son escasas.

Clima de Formosa, Servicio
Meteorológico Nacional.
Datos estadísticos climatológicos.



FLORA

La provincia de Formosa presenta una fitogeografía variada: selvas en las riberas de los ríos, montes de madera dura como el quebracho, vegetación higrófila en las áreas pantanosas y monte xerófilo, con algarrobos y espinillos, en la parte occidental más seca.

El parque Chaqueño Occidental es la zona intermedia entra la sierra y la llanura chaqueña. posee especies arboreas comunes a las formaciones vecinas, pero no propias, predominando un arbol de corteza rica en tanino, el cebil, por el cual algunos denominan a este parque como Formacion de Cebil.


La mayor parte del territorio chaqueño, al norte del Río Bermejo, está ocupado por la selva formoseña, cuya densidad aumenta del oeste al este. De menor altura y espesura que la selva misionera, se observan en ella individuos de hasta 25 m., parte de una formación que se torna más enmarañada en el este, con malezas enredaderas y plantas trepadoras.



El Río Bermejo se caracteriza por ser una gran planicie cubierta de monte y surcada por riachos con la misma orientación que los ríos que la limitan. Está poco poblada y esto hace que la acción antrópica no haya modificado en demasía su entorno natural.

Frecuentemente el suelo está cubierto de densas comunidades de chaguar, llamados localmente "chaguales", que resultan impenetrables tanto para el hombre como para algunos animales. Se observan bosquecillos densos de palo bobo o aliso de río, de sauce criollo, de tusca y matorrales de suncho, algarrobo blanco, chañar, guaraniná y vinal, palo lanza, la mora, el palo flojo, el zapallo caspi y el guayacán.

En los suelos arcillosos y de relieve deprimido se ubican bosques de palo santo, dando lugar a una de las formaciones vegetales mas característica del Chaco Seco: el palosantal. Esta especie posee una preciada madera de gran calidad, que ha sido muy buscada desde tiempos virriinales.



El Palo Santo es popular por su madera aromática y por sus flores naranjas.

Esto ha motivado una tenaz persecución que ha puesto en peligro sus poblaciones naturales, que han disminuido en forma alarmante.

De no tomarse las medidas de protección necesarias en toda el área de su distribución, no debe extrañarnos que el palo santo se encuentre en breve en peligro de desaparecer.

Los árboles más destacables son el quebracho colorado santiagueño y quebracho blanco, especies que llegan a adquirir alturas mayores a los 20 metros. Los acompañan el palo santo, mistol, palo cruz, yuchán o palo borracho de flor amarilla, el itín o palo mataco, como así también cactáceas de gran porte como el ucle y el cardón. Encontramos al duraznillo, garabato, tala, sacha sandía, brea, el quimil, un enorme cactus de porte arbóreo, entre muchas otras

Toda la variedad ambiental da sustento a una variada flora, que favorecida por el clima subtropical y la abundancia de agua, se desarrolla en forma exuberante.

En los ambientes abiertos cubiertos con palmares de palma blanca, hallaremos una densa y continua cubierta herbácea formando bellos pastizales.

Adaptados a soportar inundaciones, están compuestos por gramíneas como el espartillo, que llega a tener 50cm. de altura, la paja amarilla y la paja boba.

Esta última crece generalmente en campos cubiertos de nidos de termitas, conocidos localmente con el nombre de "tacurúes".

Algunos ejemplos dignos de mencionar son el lapacho, de hermosas flores rosadas, el quebracho colorado chaqueño, el urunday y el espina corona, entre muchos otros. En la costa del curso del Río Pilcomayo, hallamos la Selva en Galería, densamente cubierta de enredaderas, lianas y epífitas se observan enormes árboles, de hasta 20 m. de altura, como el tarumá y el higuérón, acompañados de sauces criollos, cebil colorado u horca cebil, lapacho negro, roble, cedro, timbó blanco, tipa colorada, biraró colorado, laurel, tipa blanca, urunday, garabato y timbó morotí, alisos de río y el ingá, que vegetan sobre las orillas.

Los ambientes acuáticos sostienen una abundante flora, que varía en cuanto a su composición en especies, a medida que nos alejamos de la orilla hacia el centro del cuerpo de agua. Nos encontraremos en primer término con densas comunidades de guajó y pirí, que cubren los bordes de las lagunas, alcanzando a veces los dos metros de altura, acompañan la totora, la achira y la paja brava. hacia el centro de la laguna hallaremos una enorme variedad de plantas flotantes como el conocido camalote o aguapey, repollitos, helechitos y lentejitas de agua.

En las riberas, pueden hallarse agrupaciones casi puras de sauces, palmeras yatay, pindó y palma blanca que conforman bosques en galería. También el palo blanco se congrega en isletas que se separan unas de otras por claros, que son terrenos libres de vegetación por la salinidad y anegamiento que presenta el suelo.

En esteros y bañados, es característica la vegetación acuática hacia el oeste, es evidente el empobrecimiento forestal ante la disminución progresiva de especies e individuos.

Una de las características más notables del Palo Borracho es la característica forma de su tronco. El árbol es originario de Argentina (Salta, Formosa, Catamarca, Jujuy...) tierras muy áridas y que reciben muy pocas lluvias. Por la noche el Palo Borracho bebe el agua del rocío y va almacenándola en un depósito que alberga en su interior. Los animales lo saben, y cuando aprieta la sed y no encuentran otras fuentes, rascan el árbol hasta hacerle una herida por donde mana el líquido.





El Tatú Carreta, es cazado para consumir carne. Se lo captura para llevarlo a los zoológicos, museos, coleccionistas, o bien para ocupar el caparazón como caja de resonancia. Su mayor y casi único depredador, es el hombre.



Los Tapir, son mas bien grandes pueden medir uno o dos metros de largo, y pesar 150 y 300kg. Son animales con mucha historia, datan de hace 55 millones de años.

FAUNA

En la región formoseña habita la fauna típica de los ambientes semiáridos del chaco occidental. El tatú carreta o tatú-guazú, especie en peligro de extinción, se encuentra con cierta frecuencia, siendo una de las pocas áreas protegidas que lo ampara en el país.

El T oso hormiguero grande o yurumí también tiene comprometida su supervivencia en toda su área de distribución. Igualmente, hoy en día, pueden ser observados mientras se alimentan de los termiteros y hormigueros que abundan en el área.

Dado que existen ambientes del tipo fluvial y acuático, junto a los característicos de las zonas mas aridas, encontraremos especies representantes de ambos coexistiendo.



Oso hormiguero grande o Yurumí. Habitante la R. N. Formosa

Especies como la vizcacha, el piche llorón, el quirquincho y el gualacate o peludo, huyen del calor y de la desecación que producen las altas temperaturas refugiándose en sus cuevas. El conejo de palo, el zorro gris, el zorrino, la corzuela parda y los pecaríes, el de collar y el labiado, permanecen durante el mediodía a la sombra de la vegetación, para ponerse en actividad apenas baja el sol.

En las riberas de los ríos es posible hallar las huellas del herbívoro más grande de la región: el anta, tapir o gran bestia, junto a las de coipo o falsa nutria, las de mayuato, aguará popé u osito lavador sudamericano, las de carpincho, e inclusive de yacarés, entre muchas otras.

Dada la escasez de los ambientes acuáticos se observa una llamativa diversidad de aves, entre las que se destacan las garzas, el jabirú, los biguáes, chajáes, espátulas rosadas, patos de varias especies, etc.

Los montes son refugio de otras especies aladas, como la bullanguera charata, de codiciada carne; las chuñas, como la de patas negras y la de patas rojas; los loros, como el hablador y el calancate, además de una multitud de pequeñas aves.

También están presentes los ofidios, y los representan la temida yará, de mortífero veneno, la inofensiva boa de las vizcachas o lampalagua, que llega a los tres metros de longitud, y una gran variedad de culebras.

Hallaremos aves principalmente corredoras, de largas patas y cuello, como la chuña de patas rojas y el ñandú.

Los mamíferos, aguará-guazú, que a pesar de su gran tamaño se alimenta de pequeñas presas, como perdices, ratones, reptiles, etc.

Este curioso zorro autóctono, por haber sido perseguido injustamente por mucho tiempo, es hoy uno de las especies de la fauna argentina que se encuentra en peligro de extinción. Los termiteros o tacurúes de las sabanas con Palmares, constituyen la principal fuente de alimento de otro vertebrado peculiar: el oso hormiguero grande o yurumí, también amenazado de extinción.

Pecaríes de collar, corzuelas y mayuatos, que entre muchas otras especies frecuentan estos bosques altos en busca de alimento y refugio.

Las Selvas en Galería del Bermejo son el refugio del raro mono de noche o mirikiná, el único primate argentino de hábitos nocturnos.



Aotus azarae es el nombre científico del mono nocturno o marikiná de Azara, un pequeño de 1,2 kg de peso que vive en bosques y selvas. El nombre, Aotus, significa "sin orejas".

Pasa el día durmiendo en los árboles, y muy raras veces baja al suelo, ya que se desplaza de una copa a otra usando lianas. Vive en pequeños grupos familiares formados normalmente por los padres y de 2 a 4 hijos. Sus enormes ojos están adaptados a la noche, que dedica a cazar invertebrados y comer fruta, además de a sus relaciones familiares. Es más activo cuando hay luna llena.

De cola anillada, denso y sedoso pelaje, este pequeño monito sorprende por sus enormes ojos que se parecen a los de una lechuza. La destrucción de su ambiente y la captura como mascota lo han hecho muy raro y podemos darnos por afortunados si conseguimos verlo en las copas de los árboles más altos.

Allí también es posible ver al raro moitú, gran ave de la familia de las pavas de monte. Integralmente de color negro el macho y barrado en blanco y negro la hembra, es una especie muy perseguida por su exquisita carne.

Los esteros, embalsados y lagunas están densamente poblados por vertebrados acuáticos de todo tipo. Muchas especies de peces son alimento de garzas, del jabirú o juan grande, la más grande de las cigüeñas argentinas, de los yacarés (el negro y el overo) y de mucho otros animales. Un gran reptil acuático: la boa curiyú, que llega a medir cuatro metros de longitud. Peces como las tarariras, anguilas y cascarudos, poseen adaptaciones que les permiten sobrevivir en tales condiciones

Algunos pueden respirar aire atmosférico y permanecer en pequeñísimos charcos; otros, ayudados por sus fuertes aletas, se trasladan reptando en busca de lugares más húmedos; sólo unos pocos poseen la extraordinaria capacidad de enterrarse en el barro, cubrirse de una sustancia protectora que los encierra en un "capullo" y sumirse en un profundo letargo a la espera de las próximas lluvias, tal como lo hace el pez pulmonado o lepidosirena

Muchos de los insectos no son perjudiciales a excepción de la vinchuca que transmite la enfermedad de chagas, la garrapata que provoca la enfermedad de la tristeza en los vacunos, los

mosquitos y las termitas, especies de hormigas pequeñas que construyen montículos de tierra tucurus o termiteros que alcanzan a tener más de un metro de altura, cubriendo terrenos de gran superficie, llamados tucuruzales.

En cuanto a los insectos, los más abundantes son del Orden de los Himenópteros (Hormigas), de las cuales existen diversas especies del Género *Atta*, que se destacan por su efecto sobre los Ecosistemas, sobre todo en los suelos, ya que remueven aproximadamente 1.100 Kg de suelo por Ha.

Asimismo son muy abundantes dentro del Orden Himenóptero las abejas y avispas, y su importancia es fundamental para la supervivencia de numerosas especies, entre las cuales se encuentran muchas leñosas, ya que su actividad como polinizadoras permiten su regeneración. Cabe destacar dentro del Orden Hemíptera a la Vinchuca (*Triatoma infestans*), como vector de la enfermedad del Chagas, enfermedad esta muy extendida en toda el área del norte argentino. Otros Ordenes importantes, presentes son: Coleópteros (Cortapalos y Taladrillos), Lepidópteros (Mariposas y Polillas), Dípteros (Moscas y Mosquitos) y Ortópteros (Langostas y Tucuras).

Acompañan a los insectos, en el desempeño de sus roles ecológicos, un gran número de invertebrados como Acaros (garrapatas y polvorines), Arañas, Escorpiones y Caracoles.



La hormiga es un pequeño insecto himenóptero de los trópicos y zonas templadas que corresponde a unas 3500 especies de la familia formícidos. Todas las hormigas conocidas son sociables; viven en colonias, que pueden estar compuestas por unos pocos individuos, o por muchísimos de ellos, hasta 100 000 o más. Son reconocibles por su cintura, formada por un estrecho segmento, o segmentos, entre el tórax y el abdomen.

RECURSOS HÍDRICOS

La estructura del terreno formoseño, la cual se destaca por su inclinación, influye en el escurrimiento de los ríos Pilcomayo, Bermejo o Teuco y otros arroyos que corren paralelos a estos. El río Pilcomayo obtiene su caudal proveniente de los deshielos en las cumbres de Bolivia, su cauce es muy cambiante. El río Bermejo nace en el oeste de Argentina. Ambos ríos son afluentes del río Paraguay.

Los Ríos

La mayoría de los ríos de la región de la llanura chaqueña pertenecen a las pendientes de los ríos Paraguay y Paraná y responden a un régimen periódico pluvial estival. Los ríos más importantes que recorren el territorio formoseño son el Paraguay, el Paraná y el Bermejo.

El río **Paraguay**, con una longitud de 2.550 kilómetros, es el tributario más importante del Paraná. Nace en la meseta de Matto Grosso, Brasil, en las sierras do Parecis y el Tombador. Se caracteriza por la presencia del Pantanal, depresión de 770 Km de largo y 60.000 Kilómetros cuadrados, que actúa como una gigante esponja que retiene las aguas en las épocas de lluvias y las deja escurrir una vez cubierta su capacidad de embalse natural.

Se encuentra bordeado por una franja (cuyo ancho máximo es de aproximadamente 10 km.), que presentan formas ahusadas y de meandros; el divagar del río en su planicie aluvial o de inundación, origina un relieve peculiar, con presencia de albardones semilunares.

Río Paraguay



El río es navegable para barcos de mediano porte en épocas de crecidas como febrero, julio y noviembre; su caudal al llevar muchos sedimentos da una coloración rojiza a sus aguas.

El río **Bermejo**, que recorre las provincias de Salta y Jujuy y constituye el límite entre las provincias de Chaco y Formosa, nace en Bolivia. Este río cambió su curso en el año 1870, pero actualmente fluye por el denominado río Teuco. Ese antiguo cauce, denominado Bermejito, vuelve a unirse en Confluencia con el Teuco. A partir de entonces, el Bermejo inferior realiza el recorrido hasta la desembocadura en el río Paraguay. La cuenca del Bermejo tiene una longitud de 1.450 Km. El río Bermejo posee gran carga sedimentaria, que acarrea problemas hasta en el delta bonaerense, pero hasta el momento, pese a ser muy meandroso mantiene un eje central. No se desparrama hacia cualquier dirección. En las épocas de gran creciente, sobrepasa sus barrancas inundando varios Km a sus costados, pero manteniendo su cauce principal.



El río **Pilcomayo** nace en los Andes Bolivianos, y desagua en el río Paraguay. Se caracteriza por tener gran carga sedimentaria que aumenta el nivel de su lecho provocando una alta inestabilidad. Por esto se fue retrotrayendo hacia el oeste unos 20 Kilómetros por año. Tiene un curso normal hasta las proximidades de Tucumancito, desde allí hasta las inmediaciones de Salto Palmar, el río permanece seco, otra naciente con la denominación de Pilcomayo Inferior se inicia desde dicha localidad, hasta su desembocadura en el río Paraguay. Hoy penetra en la provincia de Formosa, solo por unos 35 Km. La no concientización del problema puede ocasionar la pérdida del río con la consiguiente desertización de una vasta zona de la provincia. Los ríos menores o riachos más destacados de la provincia son en el nordeste: El Porteño, Negro, Salvación, El Pavao, Tatù-Pirè, Monte Lindo Grande, Monte Lindo Chico, Malvinas Argentinas, Pilagà, Timbò Porà, y Hè- Hè. En el sudeste: San Hilario, Divagan, Formosa, Alazán, Ramírez, Salado, Corta Pick y en el sudoeste, El Teuquito. Debido a las características del relieve abundan en la provincia lagunas y esteros.



El Parque Nacional Río Pilcomayo, tiene el objetivo de proteger pastizales, esteros, lagunas y selvas en galería típicos de la eco-región del chaco húmedo y oriental. A orillas del río que le da nombre y al límite con la República del Paraguay, se extiende por una superficie de 47.754 hectáreas.



Demografía




UBICACIÓN

La provincia de Formosa se encuentra ubicada en la región chaqueña de la República Argentina, con una superficie de 72.066 Km². Su población alcanza los 486.559 habitantes, mientras que su ciudad capital, fundada en 1879 y del mismo nombre que la provincia, es habitada por 209.787 habitantes (censo 2001).

El nombre tiene su origen en la denominación que dieron los cosquistadores a la curva que describe el río Paraguay frente a la ciudad capital. Por su belleza el lugar fue denominado: "Vuelta Formosa".

Superficie: 72.066 Km²

Población: 486.559 habitantes (Censo 2001)



Capital Provincial: Formosa

Principales Ciudades: Formosa, Clorinda, Comandante Fontana, Ingeniero Juárez, Pirané, El Espinillo.

Superficie sobre el total del País: 1,9 %

Límites: Al norte y al este con la República del Paraguay; al sur con la provincia del Chaco, y al oeste con la provincia de Salta.

Población Urbana: 56 %

Población Rural: 44 %

Densidad: 5,0 % hab/km²

Densidad sobre el total del país: 1,1 %

Economía de la región:

Agricultura, Ganadería, Minería..... 22 %

Industria..... 32 %


Servicios..... 48 %

Departamento más poblado 2001: Formosa (210.071 habitantes)

Departamento con mas varones 2001: Formosa (102.134 habitantes)

Departamento con mas mujeres 2001: Formosa (107.937 habitantes)

Población extranjera empadronada en la provincia: 21.890 habitantes



Ciudades mas importantes

Formosa, Clorinda, Comandante Fontana, Ingeniero Juárez, Pirané, Las Lomitas, Ibarreta, Palo Santo, El Colorado, Juan B. Alberdi, Laguna Blanca.

- La provincia de Formosa esta ubicada en la region Noroeste, en la parte Norte de la República Argentina.



Las ciudades que componen la provincia son:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| *Buena Vista | *Laguna Yema |
| *Clorinda | *Las Lomitas |
| *Colonia Pastoril | *Los Chiriguano |
| *Comandante Fontana | *Mayor Vicente Villafañe |
| *El Colorado | *Mision San Francisco De Laishi |
| *El Espinillo | *Mision Tacaagle |
| *Estanislao Del Campo | *Mojon De Fierro |
| *Formosa | *Palo Santo |
| *Fortin Cabo 1º Lugones | *Pirane |
| *General Enrique Mosconi | *Posta San Martin |
| *General Guemes | *Pozo De Maza |
| *General Lucio Victorio Mansilla | *Pozo Del Tigre |
| *General Manuel Belgrano | *Riacho He He |
| *Gran Guardi | *San Hilario |
| *Herradura | *Siete Palmas |
| *Ibarreta | *Subteniente Perin |
| *Ingeniero Juarez | *Tres Lagunas |
| *Laguna Blanca | *Villa Dos Trece |
| *Laguna Naick Neck | *Villa Escolar |
| | *Villa general Quemes |